

Bravo Premium, 13549 N

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling:

- a. in de teelt van wintertarwe en zomertarwe
- b. in de teelt van wintergerst en zomergerst.

Bij de interpretatie van wat valt onder bovengenoemde teelten is uitgegaan van de Definitielijst toepassingsgebieden gewasbeschermingsmiddelen, versie juni 2010.

Per teelt zijn maximaal 2 toepassingen toegestaan.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van 75 % driftreducerende spuitdoppen.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen propiconazool en chloorthalonil.

Propiconazool behoort tot de DMI fungiciden. De Frac code is 3. Chloorthalonil behoort tot de chloornitrillen. De Frac code is M5 .

Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Veiligheidstermijn:

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan: 6 weken voor tarwe en gerst.

GEBRUIKSAANWIJZING

Toepassingen

Wintertarwe en zomertarwe, ter bestrijding van *Septoria nodorum*, *Septoria tritici* en roesten (*Puccinia striiformis*, *Puccinia recondita*).

Maximaal 2 behandelingen uitvoeren met een spuitinterval van 21 dagen in de periode vanaf het schieten van het gewas tot het waterrijp stadium (BBCH 30-71).

Dosering: 2 liter middel per ha

Winter- en zomergerst, ter bestrijding van bladvlekkenziekten (*Rhynchosporium secalis*) en dwergroest (*Puccinia hordei*).

Maximaal 2 behandelingen uitvoeren met een spuitinterval van 21 dagen in de periode vanaf het schieten van het gewas tot het begin van de aarvorming (BBCH 30-51).

Dosering: 2 liter middel per ha