



Adexar

Toelatingsnummer 13978 N

Productgroep:	fungicide
Formulering:	emulgeerbaar concentraat
Werkzame stof:	62,5 g/l epoxiconazool 62,5 g/l fluxapyroxad



GEVAAR

Gevarenaanduidingen:

H302	Schadelijk bij inslikken.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H351	Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H360f	Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

P261	Inademing van damp/spuitnevel vermijden.
P280	Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.
P301+P312	NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)).
P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P308+P313	Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P333+P313	Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
SP1	Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies: Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts. Hulpverleners moeten aan eigen bescherming denken. Bij gevaar van bewusteloosheid, plaatsing en transport in stabiele zijligging. Verontreinigde kleding verwijderen.

Na inademen: Rust, frisse lucht, doktershulp.

Na huidcontact: Direct met veel water en zeep grondig wassen, doktershulp.

Na contact met de ogen: 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen, door oogarts laten controleren.

Na inslikken: Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:

Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel, toegepast door middel van een gewasbehandeling, in de teelt van:

- a. wintertarwe, zomertarwe, triticale en spelt;
- b. wintergerst en zomergerst;
- c. winterrogge.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen epoxiconazool en fluxapyroxad. Epoxyconazool behoort tot de 'demethylation inhibitors' (DMI fungiciden), subgroep triazolen. De Frac code is 3. Fluxapyroxad behoort tot de carboximiden. De Frac code is 7. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan wanneer in percelen die grenzen aan oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen.

Veiligheidstermijn

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan **35 dagen** voor **wintertarwe, zomertarwe, wintergerst, zomergerst en winterrogge, triticale en spelt**.

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor het gezicht tijdens het aanmaken van de spuitvloeistof en het spuiten.

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING

Toepassingen

Wintertarwe, zomertarwe, triticale, en spelt, ter bestrijding van aantasting door bladziekten (zgn. afrijpingsziekten), veroorzaakt door bruine roest (*Puccinia recondita*), gele roest (*Puccinia striiformis*), meeldauw (*Erysiphe graminis*), gele bladvlekkenziekte (DTR) (*Pyrenophora tritici-repentis*) en bladvlekkenziekte (*Septoria tritici* en *Septoria nodorum*).

Bij de aanwezigheid van symptomen een behandeling uitvoeren in de periode vanaf einde uitstoeling tot aan het einde van de bloei (BBCH 30 - 69). Indien nodig de toepassing herhalen met een interval van minimaal 21 dagen. Maximaal 2 toepassingen per teelt uitvoeren.

Dosering: 2 liter middel/ha

Wintertarwe, zomertarwe en triticale, ter bestrijding van oogvlekkenziekte (*Pseudocercospora herpotrichoides*). Wanneer tussen uitstoelen en stengelstrekking symptomen waargenomen worden, een behandeling uitvoeren. Aanwezige bladvlekkenziekten (*Septoria tritici* en *Septoria nodorum*), meeldauw (*Erysiphe graminis*), bruine roest (*Puccinia recondita*) en gele roest (*Puccinia striiformis*) worden eveneens bestreden.

Dosering: 2 liter middel/ha

Wintergerst en zomergerst, ter bestrijding van dwergroest (*Puccinia hordei*), bladvlekkenziekten (*Rhynchosporium secalis* en *Ramularia collo-cygni*), netvlekkenziekte (*Pyrenophora teres*), meeldauw (*Erysiphe graminis*) en gele roest (*Puccinia striiformis*).

Bij de aanwezigheid van symptomen een behandeling uitvoeren in de periode vanaf einde uitstoeling tot aan het einde van de bloei (BBCH 30 - 69). Indien nodig de toepassing herhalen met een interval van minimaal 21 dagen. Maximaal 2 toepassingen per teelt uitvoeren.

Dosering: 2 liter middel/ha

Winterrogge, ter bestrijding van bruine roest (*Puccinia recondita*), bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*) en meeldauw (*Erysiphe graminis*).

Bij de aanwezigheid van symptomen een behandeling uitvoeren in de periode vanaf einde uitstoeling tot aan het einde van de bloei (BBCH 30 - 69). Indien nodig de toepassing herhalen met een interval van minimaal 21 dagen. Maximaal 2 toepassingen per teelt uitvoeren.

Dosering: 2 liter middel/ha

Product stewardship

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.

BASF Nederland B. V., Divisie Agro



**BASF Nederland B.V.
Divisie Agro
Postbus 1019
6801 MC Arnhem
Tel. 026-3717171**