



BIJLAGE: WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT AGRICHEM ASULAM 2

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011 onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Spinazie (productie-teelt) onbedekte teelt	voor opkomst	Breedbladige onkruiden en eenjarige grasachtige onkruiden	6 l/ha	1 per 12 maanden	6 l/ha per 12 maanden	nvt
Spinazie (zaadteelt)	voor opkomst	Breedbladige onkruiden en eenjarige grasachtige onkruiden	6 l/ha	1 per 12 maanden	6 l/ha per 12 maanden	nvt
Hyacint onbedekte teelt	na opkomst	Breedbladige onkruiden	2 l/ha*	6 per teeltcyclus	12 l/ha per teeltcyclus	14
Tulp onbedekte teelt	na opkomst	Breedbladige onkruiden	2 l/ha*	6 per teeltcyclus	12 l/ha per teeltcyclus	14
Lelie onbedekte teelt	na opkomst	Breedbladige onkruiden	1-2 l/ha*	12 per teeltcyclus	12 l/ha per teeltcyclus	14
Gezaaide zomerbloemen onbedekte teelt	na opkomst	Breedbladige onkruiden	2 l/ha	6 per teeltcyclus	12 l/ha per teeltcyclus	14
Bloemenzaad onbedekte teelt	na opkomst	Breedbladige onkruiden	2 l/ha	6 per teeltcyclus	12 l/ha per teeltcyclus	14

* In LDS toepassing

De gevoeligheid van de onkruiden is afhankelijk van het toepassingstijdstip, de dosering is afhankelijk van de grondsoort.

Agrichem Asulam 2 moet worden toegepast in minstens 600 liter water per ha.

In lelie kan de toepassing van Agrichem Asulam 2 onder bepaalde omstandigheden (warm weer, veel instraling) en in sommige cultivars leiden tot enige gewasreactie in de vorm van lichtgroene bladplekjes.

Gezien de beperkte ervaring en het grote assortiment aan gewassen in gezaaide zomerbloemen en gewassen bestemd voor bloemenzaadproductie verdient het aanbeveling, voor zover geen ervaring werd opgedaan, door middel van een proefbespuiting vast te stellen of het te behandelen gewas het middel goed verdraagt.

Toepassingsvoorwaarden

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen dient in de teelt van bloemenzaad en gezaaide zomerbloemen, lelie, hyacint, tulp en spinazie gebruik te worden gemaakt van een van de volgende maatregelen:

- Lage spuitboomhoogte (met daarvoor geschikte spuitapparatuur, maximaal 30 cm boven de top van het gewas) in combinatie met een driftarme Venturidop en een kantdop, toe te passen;
- sleepdoek met minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen;
- overdekte beddenspuit.