



Rodilon[®]

HAYER MIX

RODENTICIDE


- ✓ Bevat 80% gepelde haver
- ✓ Geen aangetoonde resistentie
- ✓ Turbo-geïmpregneerd

Bevat Bitrex[®] : vermindering van het risico op toevallige inname, zonder dat de aantrekkingskracht voor knaagdieren vermindert.

Toelatingsnummer: 13583 N
Aard van het preparaat: RB (Lokmiddel klaar voor gebruik)
Werkzame stof: Difethialon
Gehalte: 0.0025%

Inhoud :

9 kg e



RODILON HAYER MIX



Huismuizen, zwarte en bruine ratten





Rodilon®
HAYER MIX

Toegelaten gebruik:

Middel ter bestrijding van huismuizen in gebouwen en middel ter bestrijding van ratten in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen als laatste schakel in een bestrijding die geheel gebaseerd is op de principes van IPM.

Doelorganismen (inclusief ontwikkelingsstadia)

Bruine ratten. Zwarte ratten. Huismuizen.

Toepassing

Huismuizen: in afgesloten ruimten. Bruine en zwarte ratten: in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen.

Toepassingsmethode

Het middel moet worden uitgelegd in speciaal hiervoor bestemde lokaasdozen.

Dosering en frequentie van toepassing

Bestrijding van muizen:

Plaats de lokdozen op een afstand van 1 tot 3 meter van elkaar afhankelijk van de grootte van de muizenplaag. Vul de lokdozen met 25 gram lokaas.

Bestrijding van ratten in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen:

Plaats de lokdozen op een afstand van 4 tot 10 meter van elkaar afhankelijk van de grootte van de rattenplaag. Vul de lokdozen met 100 gram lokaas. (NB: in geval van zwarte ratten vooral hooggelegen voerplaatsen inrichten).

Gebruikers

Professioneel gebruik

Gebruik om gebouwen en voedselopslagplaatsen:

- tot 1-1-2017 uitsluitend door bedrijven die zich hebben aangemeld bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.
- vanaf 1-1-2017 uitsluitend door bedrijven die zijn gecertificeerd voor IPM-buitengebruik op basis van een protocol dat voldoet aan de eisen zoals die zijn vastgesteld en gepubliceerd door het Ctgb.

Gebruiksaanwijzing

Middel ter bestrijding van huismuizen in gebouwen en middel ter bestrijding van ratten in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen
Rodilon Haver mix is kant-en-klaar lokaas dat binnenhuis mag worden toegepast voor de bestrijding van ratten en muizen. Het middel mag in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen worden toegepast voor de bestrijding van ratten.

Plaats het lokaas in de hiervoor geschikte lokaasdoosjes. De lokaasdoosjes vervolgens uitzetten op plaatsen waar de ratten en muizen geregeld komen: in de nabijheid van hol ingangen, op looppaden (sporenl) en op plaatsen waar de dieren voedsel halen of knagen. Het middel dient gedurende een aantal dagen in voldoende mate te worden gegeten door ratten en huismuizen.

Controleer de eerste opname na 3 dagen en vervolgens regelmatig op basis van opname (wekelijks of elke 14 dagen). Ververs of vul het lokaas daar waar nodig is aan tot er in het geheel geen opname meer plaats vindt. Middel dat beschimmeld of verontreinigd is totaal vervangen. Indien het lokaas geheel opgegeten is, meer lokaaspunten inrichten en/of de controlefrequentie verhogen.

Verder de nodige maatregelen (laten) treffen in het belang van huis- en ratvering (ingangen afdichten, mogelijk voer verwijderen, etc.). Indien in aangebouwde ruimten ook ratten of muizen aanwezig zijn, zullen de resultaten slechts blijvend zijn, wanneer ook daar een bestrijdingsactie wordt uitgevoerd.

Resistentie management:

Voor de werkzame stof aanwezig in het middel, difethialon, is er een risico dat muizen of ratten resistentie ontwikkelen. Gebruik dit middel daarom niet in gevallen dat resistentie waarschijnlijk is, bijvoorbeeld in gevallen dat vorige bestrijdingsacties met difethialon bevattende middelen niet hebben geresulteerd in een duidelijke vermindering van de populatie. Het middel mag niet permanent gebruikt worden.

Bestrijding van ratten om gebouwen en voedselopslagplaatsen

:Bij gebruik ter bestrijding van ratten om gebouwen of voedselopslagplaatsen mag het middel alleen gebruikt worden als laatste schakel in een bestrijdingsprogramma dat geheel gebaseerd is op de principes van IPM, en wel:

- tot 1-1-2017 uitsluitend door bedrijven die zich hebben aangemeld bij de Inspectie Leefomgeving en Transport
- vanaf 1-1-2017 uitsluitend door bedrijven die zijn gecertificeerd voor IPM-buitengebruik op basis van een protocol dat voldoet aan de eisen zoals die zijn vastgesteld en gepubliceerd door het Ctgb.

Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, eerste hulp instructies en maatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Dit product bevat anticoagulantia die een groot risico vormen voor doervertigting van (roof)vogels en zoogdieren. Buitengebruik is daarom alleen en bij uitzondering toegestaan voor de bestrijding van ratten indien alle andere maatregelen in kader van het bestrijdingsprogramma, gebaseerd op de principes van IPM, onvoldoende resultaat hebben geleverd.

Zet het lokaas veilig uit zodat het risico van consumptie door andere dieren (huis- of landbouw dieren, vogels) en kinderen wordt voorkomen. Indien mogelijk het lokaas zo vast maken dat het niet weggesleept kan worden. De lokaasdoosjes markeren zodat duidelijk is dat ze rodenticiden bevatten. Katten tijdens een bestrijdingsactie extra goed voeren. Na gebruik handen wassen.

Houdt dit etiket beschikbaar wanneer medisch advies wordt ingewonnen.

In geval van nood contact opnemen met een dokter.

Tegengif: Vitamine K (onder medische begeleiding)

Instructies voor de veilige afvoer van het product en zijn verpakking

Wanneer de opname van lokaas is gestopt, de resten van het lokaas verzamelen en in plastic verpak aanbieden bij het Klein Chemisch Afval (KCA) depot. Dode dieren (de eerste worden na ca. 3 dagen gevonden) eveneens verzamelen en in plastic verpak in het vuilnisvat deponeren, opdat huisdieren en andere dieren niet door het opeten van de kadavers worden vergiftigd.

Risico zinnen

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorg zinnen

Buiten het gebruik van kinderen houden.

Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Voorkom lozing in het milieu.

NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIGCENTRUM of een arts raadplegen.

Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Houdbaarheid

5 jaar.

DISCLAIMER

Daar dit product als zodanig van goede kwaliteit is, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele schade, ontstaan door een verkeerde toepassing of door een minder goede werking als gevolg van onjuist gebruik.

NL85344757A - *ARTICLE 85351818*

Chargenummer: Zie elders op de verpakking.
Productie datum: Zie elders op de verpakking.
Houdbaarheid: Tot 5 jaar na productie datum.

TOELIATINGSHOUDER :

LiphaTech S.A.S.,
3 Bonnel BP
47480 PONT DU CASSE
FRANKRIJK

2481-409013 N / BAY

DISTRIBUTEURS :

Bayer CropScience SA-NV
Postbus 231, 3640 AE MIJDRECHT
Tel.nr.: (0297) 280 413