

Merlin

Toelatingsnummer: 11894 N W.2

Aard van het preparaat: Water dispergeerbaar granulaat

Werkzame stof: isoxaflutool

Gehalte: 75%

Inhoud: 500 gr



Waarschuwing

Gevarenaanduidingen

Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

Inhoud/verpakking afvoeren naar de daartoe bestemde locaties volgens locale/regionale/ nationale regelgeving.

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus
Maïs	Voor-opkomst	Éénjarige onkruiden	130 g/ha	1
	Na opkomst	Éénjarige onkruiden	70 – 100 g/ha	1

Toepassingsvoorwaarden

MERLIN niet in combinatie toepassen met andere herbiciden en niet later toepassen dan het 3 bladstadium van maïs i.v.m. kans op schade.

In verband met het karakter van het middel, is bij herinzaai na het mislukken van de maïsteelt tengevolge van vorst of droogte, voorzichtigheid geboden, daar schade aan vervanggewassen kan optreden.

Aanbevelingen

- Het middel wordt via de wortels en blad opgenomen en heeft een systemische werking
- Merlin bestrijdt voornamelijk éénjarige tweezaadlobbige onkruiden zoals kamille, melganzevoet, muur, zwarte nachtschade en papegaaiekruid.
- Eénjarige grassen als hanepoot, Digitaria en Setaria soorten worden goed bestreden, straatgras is ongevoelig.
- Merlin bij voorkeur toepassen op vochtige grond of in een periode dat regen wordt verwacht.
- Na opkomst de hoogste dosering toepassen ter bestrijding van één-jarige grassen, melganzevoet, kamille en perzikkruid. De laagste dosering is voldoende ter bestrijding van zwarte nachtschade, muur en knopkruid.
- Na de toepassing van Merlin kan zonodig na opkomst van de maïs nog een aanvullende bestrijding worden uitgevoerd d.m.v. een mechanische bewerking of een daartoe geschikt en toegelaten middel.
- Bij de bespuiting dient overlap van spuitbanen zorgvuldig te worden vermeden, i.v.m. kans op gewas schade.
- In verband met het karakter van het middel, is bij herinzaai na het mislukken van de maïsteelt tengevolge van vorst of droogte voorzichtigheid geboden, daar schade aan vervanggewassen kan optreden. Vooralsnog zijn maïs, aardappel, schorseneren, zomertarwe, haver en zomergerst veilige vervanggewassen na een oppervlakkige grondbewerking. Na een kerende grondbewerking is ook inzaai van erwten en wortelen mogelijk.
- In normale vruchtopvolgingen zijn er geen beperkingen ten aanzien van de keuze van het volggewas.
- Niet gemengd met andere middelen verspuiten, tenzij anders aangegeven