

# Tracer®

**INSECTICIDE**

MAAG- EN CONTACTINSECTICIDE VOOR GEBRUIK IN DE TEELT VAN VOLLEGRONDSGROENTEN, GLASGROENTEN, AKKERBOUWGEWASSEN, KRUIDEN EN KLEINFRUIT

TRACER MAG GEBRUIKT WORDEN IN DE NEDERLANDSE BIOLOGISCHE TEELT.

TOELATINGSNUMMER : 12567 N 

Aard van het preparaat : suspensie concentraat  
Gehalte : Spinosad 480 gram/L

**Toelatingshouder :**  
Dow AgroSciences B.V.  
Sneeuwbeslaan 20 bus 10  
2610 Wilrijk, België  
Tel : +32.3.450.27.00

**Verdeeld door :**  
Dow AgroSciences B.V.  
Postbus 522  
NL4530 AM Terneuzen, Nederland  
Tel : 0115 67 43 20  
Website : [www.dowagro.nl](http://www.dowagro.nl)

® Registered Trademark of Dow AgroSciences LLC  
Lotnummer : zie op de fles

**STORL**  
VERPAKKING  
**BEDRIJFS-  
AFVAL**

**0.5 L e PET**



3 362130 070825 >

## GEVARENPICTOGRAMMEN



**GHS09**

**SIGNAALWOORD : WAARSCHUWING**

**GEVARENAANDUIDINGEN**

**H410** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**VOORZORGSMAATREGELEN**

**P391** Gelekte/gemorste stof opruimen.

**P501** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

**SP1** Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

**AANVULLENDE INFORMATIE**

**EUH208** Bevat 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.

**EUH401** Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.



## WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, CtoB juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

| Toepassingsgebied                                           | Type toepassing  | Te bestrijden organisme        | Dosering (middel) per toepassing | Maximale dosering (middel) per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden | Minimum interval tussen toepassingen in dagen | Veiligheidstermijn in dagen |
|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Komkommer                                                   | Gewasbehandeling | trips <sup>2</sup>             | 0,02% (20 ml/100 l)              | 0,3 l/ha                                  | 3 per teeltcyclus en 5 per 12 maanden                          | 7                                             | 1                           |
| Tomaat                                                      | Gewasbehandeling | trips <sup>2</sup>             | 0,02% (20 ml/100 l)              | 0,3 l/ha                                  | 5 per 12 maanden                                               | 7                                             | 1                           |
| Paprika                                                     | Gewasbehandeling | trips <sup>2</sup>             | 0,02% (20 ml/100 l)              | 0,3 l/ha                                  | 5 per 12 maanden                                               | 7                                             | 1                           |
| Sluitkoolachtigen (onbedekte teelt)                         | Gewasbehandeling | rupsen <sup>1</sup>            | 0,2 l/ha                         | 0,2 l/ha                                  | 4 per 12 maanden                                               | 10                                            | 3                           |
|                                                             | Traybehandeling  | Vliegen en muggen <sup>4</sup> | 12,5 ml/1000 planten             | 12,5 ml/1000 planten                      | 1 per teeltcyclus                                              | -                                             | -                           |
| Bloemkool (onbedekte teelt)                                 | Gewasbehandeling | rupsen <sup>1</sup>            | 0,2 l/ha                         | 0,2 l/ha                                  | 4 per 12 maanden                                               | 10                                            | 3                           |
|                                                             | Traybehandeling  | Vliegen en muggen <sup>4</sup> | 12,5 ml/1000 planten             | 12,5 ml/1000 planten                      | 1 per teeltcyclus                                              | -                                             | -                           |
| Broccoli (onbedekte teelt)                                  | Traybehandeling  | Vliegen en muggen <sup>4</sup> | 12,5 ml/1000 planten             | 12,5 ml/1000 planten                      | 1 per teeltcyclus                                              |                                               |                             |
| Uien                                                        | Gewasbehandeling | trips <sup>3</sup>             | 0,2 l/ha                         | 0,2 l/ha                                  | 4 per 12 maanden                                               | 10                                            | 7                           |
| Sjalotten                                                   | Gewasbehandeling | trips <sup>3</sup>             | 0,2 l/ha                         | 0,2 l/ha                                  | 4 per 12 maanden                                               | 10                                            | 7                           |
| Bosuien (onbedekte teelt)                                   | Gewasbehandeling | trips <sup>3</sup>             | 0,2 l/ha                         | 0,2 l/ha                                  | 4 per 12 maanden                                               | 10                                            | 7                           |
| Prei (met uitzondering van preiplantgoed) (onbedekte teelt) | Gewasbehandeling | trips <sup>3</sup>             | 0,2 l/ha                         | 0,2 l/ha                                  | 4 per 12 maanden                                               | 10                                            | 7                           |

<sup>1</sup> Koolwitje (*Pieris rapae*), kooluil (*Mamestra brassicae*), koolmot (*Plutella xylostella*)

<sup>2</sup> Californische trips (*Frankliniella occidentalis*)

<sup>3</sup> Tabakstrips (*Thrips tabaci*)

<sup>4</sup> Koolvlieg (*Delia brassica*)

Het gebruik in de bedekte teelt van aardbei, sla, andijvie, rucola, timkners, veldsla, courgette, augurk, vruchtgroenten van *Cucurbitaceae* met niet-eetbare schil, aubergine, asperge en kruidenteelt vers of gedroogd; en de onbedekte teelt van Chinese kool, koolraap en koolrabi is op basis van een "derdenuitbreiding". Deze "derdenuitbreiding" is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Het gebruik in de onbedekte teelt van aardbei, braam- en framboosachtigen, sla, andijvie, rucola, tuinkers, veldsla, courgette, augurk, vruchtgroenten van *Cucurbitaceae* met niet-betbare schil, stengelkool, kruidenteelt vers of gedroogd; de teelt van spinazie-achtigen en witlof (trekteelt); en de bedekte teelt van boon met peul, sluitkoolachtigen, bloemkool en broccoli, Chinese kool, koolraap en koolrabi is op basis van een "derdenuitbreiding" en beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Deze "derdenuitbreiding" is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied(en), komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Het gebruik in de teelt van bessen is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit toepassingsgebied, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

| Toepassingsgebied                            | Type toepassing              | Te bestrijden organisme                       | Dosering (middel) per toepassing | Maximale dosering (middel) per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden | Minimum interval tussen toepassingen in dagen | Veiligheidsstermijn in dagen |
|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Aardbei                                      | Gewasbehandeling             | trips, rupsen, vliegen en muggen <sup>5</sup> | 0,15 l/ha                        | 0,15 l/ha                                 | 3 per 12 maanden                                               | 7                                             | 1                            |
| Bessen, m.u.v. moerbeï, kiwibes en vlierbes  | Gewasbehandeling             | trips, rupsen, vliegen en muggen <sup>5</sup> | 0,16-0,2 l/ha                    | 0,2 l/ha                                  | 2 per 12 maanden                                               | 10                                            | 3                            |
| Braam- en framboosachtigen (onbedekte teelt) | Gewasbehandeling             | trips, rupsen, vliegen en muggen <sup>5</sup> | 0,16-0,2 l/ha                    | 0,2 l/ha                                  | 2 per 12 maanden                                               | 10                                            | 3                            |
| Sla ( <i>Lactuca</i> spp)                    | Gewasbehandeling             | trips, rupsen                                 | 0,2 l/ha                         | 0,2 l/ha                                  | 3 per teeltcyclus en 5 per 12 maanden                          | 7                                             | 3                            |
| Andijvie                                     | Gewasbehandeling             | trips, rupsen                                 | 0,2 l/ha                         | 0,2 l/ha                                  | 3 per teeltcyclus en 5 per 12 maanden                          | 7                                             | 3                            |
| Spinazie-achtigen                            | Gewasbehandeling             | vliegen en muggen, mineervlieg, rupsen        | 0,2 l/ha                         | 0,2 l/ha                                  | 3 per teeltcyclus                                              | 7-10                                          | 3                            |
| Witlof (trekteelt)                           | Gewasbehandeling op de kraag | Mineervlieg <sup>7</sup>                      | 0,5 ml/m <sup>2</sup>            | 0,5 ml/m <sup>2</sup>                     | 1 per teeltcyclus                                              | -                                             | 18                           |
| Tuinkers                                     | Gewasbehandeling             | trips, rupsen                                 | 0,2 l/ha                         | 0,2 l/ha                                  | 3 per teeltcyclus en 5 per 12 maanden                          | 7                                             | 3                            |
| Veldsla                                      | Gewasbehandeling             | trips, rupsen                                 | 0,2 l/ha                         | 0,2 l/ha                                  | 2 per teeltcyclus en 5 per 12 maanden                          | 7                                             | 14                           |
| Rucola                                       | Gewasbehandeling             | trips, rupsen                                 | 0,2 l/ha                         | 0,2 l/ha                                  | 3 per teeltcyclus en 5 per 12 maanden                          | 7                                             | 3                            |
| Boon met peul (bedekte teelt)                | Gewasbehandeling             | trips, rupsen                                 | 0,08-0,25 l/ha                   | 0,75 l/ha                                 | 2 per teeltcyclus                                              | 7                                             | 7                            |
| Augurk                                       | Gewasbehandeling             | trips, rupsen                                 | 0,02% (20 ml/100 l)              | 0,16 l/ha                                 | 5 per 12 maanden                                               | 7                                             | 1                            |

| Toepassingsgebied                                              | Type toepassing  | Te bestrijden organisme        | Dosering (middel) per toepassing | Maximale dosering (middel) per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden | Minimum interval tussen toepassingen in dagen | Veiligheidstermijn in dagen |
|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Courgette                                                      | Gewasbehandeling | trips, rupsen                  | 0,02% (20 ml/100 l)              | 0,2 l/ha                                  | 5 per 12 maanden                                               | 7                                             | 1                           |
| Vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> met niet-eetbare schil | Gewasbehandeling | trips, rupsen                  | 0,02% (20 ml/100 l)              | 0,2 l/ha                                  | 5 per 12 maanden                                               | 7                                             | 1                           |
| Aubergine                                                      | Gewasbehandeling | trips <sup>2</sup>             | 0,02% (20 ml/100 l)              | 0,2 l/ha                                  | 5 per 12 maanden                                               | 7                                             | 1                           |
| Sluitkoolachtigen (bedekte teelt)                              | Traybehandeling  | vliegen en muggen <sup>4</sup> | 12,5 ml/1000 planten             | 12,5 ml/1000 planten                      | 1 per teeltcyclus                                              | -                                             | -                           |
| Bloemkool (bedekte teelt)                                      | Traybehandeling  | vliegen en muggen <sup>4</sup> | 12,5 ml/1000 planten             | 12,5 ml/1000 planten                      | 1 per teeltcyclus                                              | -                                             | -                           |
| Broccoli (bedekte teelt)                                       | Traybehandeling  | vliegen en muggen <sup>4</sup> | 12,5 ml/1000 planten             | 12,5 ml/1000 planten                      | 1 per teeltcyclus                                              | -                                             | -                           |
| Chinese Kool                                                   | Traybehandeling  | vliegen en muggen <sup>4</sup> | 12,5 ml/1000 planten             | 12,5 ml/1000 planten                      | 1 per teeltcyclus                                              | -                                             | -                           |
| Koolrabi                                                       | Traybehandeling  | vliegen en muggen <sup>4</sup> | 12,5 ml/1000 planten             | 12,5 ml/1000 planten                      | 1 per teeltcyclus                                              | -                                             | -                           |
| Koolraap                                                       | Traybehandeling  | vliegen en muggen <sup>4</sup> | 12,5 ml/1000 planten             | 12,5 ml/1000 planten                      | 1 per teeltcyclus                                              | -                                             | -                           |
| Asperge (veredeling, opkweek, zaadteelt) (bedekte teelt)       | Gewasbehandeling | trips                          | 0,02% (20 ml/100 l)              | 0,2 l/ha                                  | 3 per teeltcyclus                                              | 7                                             | -                           |
| Kruidenteelt vers of gedroogd                                  | Gewasbehandeling | trips, rupsen                  | 0,2 l/ha                         | 0,2 l/ha                                  | 3 per teeltcyclus en 5 per 12 maanden                          | 7                                             | 3                           |

<sup>2</sup> Californische trips (*Frankliniella occidentalis*)

<sup>4</sup> Koolvlieg (*Delia brassicae*)

<sup>5</sup> Suzuki fruitvlieg (*Drosophila suzuki*)

<sup>6</sup> Bietenwieg (*Pegomya hyoscyami*)

<sup>7</sup> Witlofmineervlieg (*Napomyza cichorii*)

#### Toepassingsvoorwaarden

De traybehandeling in de teelt van sluitkool, spruitkool, bloemkool, broccoli, Chinese kool, koolraap en koolrabi, en de kraagbehandeling in witlof, moet worden uitgevoerd op een ondoordringbaar oppervlak (bv. beton).

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de onbedekte teelt van sluitkool, spruitkool, bloemkool, uien, sjalotten, bosuien en prei op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van 90% drift reducerende doppen.

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten te beschermen is toepassing in de onbedekte teelt van aardbei, veenbes, sla, andijvie, spinazie-achtigen, rucola, tuinkers, veldsla, boon met peul, courgette, augurk, vruchtgroenten van *Cucurbitaceae* met niet-eetbare schil en kruiden uitsluitend toegestaan wanneer in de eerste 14 m van het gewas, gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij, gebruik wordt gemaakt van spuitapparatuur met lage spuitboomhoogte (maximaal 30 cm boven de top van het gewas) met driftarme Venturidoppen en een kantdop en luchtondersteuning in combinatie met een teeltvrije zone van 1,5 meter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij tot aan de perceelsgrens).

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/insecten te beschermen is toepassing in aalbes, kruisbes, blauwe bes, rozenbottel en braam- en framboosachtigen uitsluitend toegestaan wanneer in de eerste 20 m van het gewas, gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij, gebruik wordt gemaakt van één van onderstaande maatregelen:

- Venturidoppen (minimaal 90% driftreducerend) met ventilatorstand 'laag' in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 4,5 meter;
- een Wannerspuit met reflectieschermen en Venturidoppen (minimaal 90% driftreducerend) (Lechler ID 90-015C) met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 4,5 meter;
- een KWH k1500-3R2 VLOS 3-rijenspuit met variabele luchtondersteuning en minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen en ventilatorstand "laag" in de eerste 20 meter van het gewas, gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter.

Om zoogdieren te beschermen is toepassing in aalbes, kruisbes, blauwe bes, rozenbottel, en braam- en framboosachtigen uitsluitend toegestaan na BBCH 51 (ontwikkeling bloeiwijze).

Gevaarlijk voor bijen en hommels. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit.

Gebruik is wel toegestaan op bloeiende planten in de kas mits er geen bijen of hommels in de kas actief naar voedsel zoeken. Verwijder of bedek bijenkorven en hommelmasten tijdens het gebruik van het product en gedurende één dag na de behandeling en vergewis u ervan dat de spuitvloeistof volledig opgedroogd is in de kas. Voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenkomen door alle openingen met insectengaas af te sluiten. Dit middel is schadelijk voor natuurlijke vijanden. Vermijd onnodige blootstelling.

Indien nog geen ervaring met het middel is opgedaan dient middels een proefbespuiting vastgesteld te worden of het gewas of het ras het middel verdraagt.

#### Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof spinosad. Spinosad behoort tot de spinosynen. De Irac code is 5. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Dit gewasbeschermingsmiddel is met de grootste zorg ter voldoening aan de hoogste eisen vervaardigd. Het is toegestaan door het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Wij kunnen echter onzerzijds bepaalde resultaten niet garanderen. Voorts kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, schade of andere gevolgen, welke direct of indirect kunnen voortvloeien uit het gebruik, het vervoer en/of het in voorraad hebben van dit middel.

**Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld  
zoals wettelijk is voorgeschreven.**

## GBRUIKSAANWIJZING

### Algemeen

Tracer is een insecticide met een maag- en contactwerking. De werking van het middel berust op overactivering van het zenuwstelsel en leidt tot verlamming van de insecten. Het middel heeft effect op niet-doelwit arthropoden, waaronder natuurlijke vijanden. Bij geïntegreerde teelten dient hier rekening mee gehouden te worden. Vermijd daarom onnodige blootstelling.

### Waarschuwing

Indien nog geen ervaring met het middel is opgedaan, dient middels een proefbespuiting vastgesteld te worden of het gewas of het ras het middel verdraagt. Na een gewas-of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd en er in kassen gedurende 2 uur geventileerd is; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

### TOEPASSINGEN

#### AARDBEI

Na vaststelling van de eerste symptomen van een aantasting een behandeling uitvoeren waarbij alle delen van de plant goed geraakt worden, zonodig herhalen. Een blokbehandeling voor trips uitvoeren in een reeks van twee tot drie behandelingen, vanaf het 9-bladstadium tot en met het moment van de voornaamste oogst (BBCH 19-87), met een minimum spuitinterval van 7 dagen. De blokbehandeling vervolgens afwisselen met een daartoe toegelaten middel met een andere werkwijze en werkzaam op trips.

**ANDIJVIE, KRUIDENTEELT, RUCOLA, SLA (Lactuca spp), SPINAZIE-ACHTIGEN, TUINKERS en VELDSL**

Voer een behandeling uit bij de aanwezigheid van jonge rupsen en/of bij de allereerste symptomen.

**ASPERGE (veredeling, opkweek, zaadteelt) (bedekte teelt)**

Na vaststelling van de eerste symptomen van een tripsaantasting een behandeling uitvoeren waarbij alle delen van de plant goed geraakt moeten worden. Een blokbehandeling uitvoeren in een reeks van twee tot drie behandelingen met een spuitinterval van 7-10 dagen. De blokbehandeling vervolgens afwisselen met een daartoe toegelaten middel met een andere werkwijze en werkzaam op trips.

**AUBERGINE, AUGURK, COURGETTE, KOMKOMMER, PAPRIKA (incl. spaanse en cayenne peper), TOMAAT en vruchtgroenten van de CUCURBITACEAE met niet eetbare schil**

Een gewasbehandeling uitvoeren na vaststelling van de eerste symptomen van tripsaantasting. De behandeling indien nodig herhalen met een minimum spuitinterval van 7 dagen. Het middel dient te worden afgewisseld met een daartoe toegelaten middel met een ander werkingsmechanisme of, indien gespoten wordt in een blok, maximaal 3 opeenvolgende behandelingen met het middel uitvoeren. Na een blok dient een daartoe toegelaten middel met een ander werkingsmechanisme en werkzaam op trips te worden gebruikt.

**BESSEN m.u.v. moerbeï, kiwibes en vlierbes**

De groep van bessen omvat aalbes, kruisbes, blauwe bes, veenbes, rozenbottel en overige bessen. Dit met uitzondering van moerbeï, kiwibes en vlierbes. Na vaststelling van de eerste symptomen van een aantasting een behandeling uitvoeren waarbij alle delen van de plant goed geraakt worden, zonodig herhalen. Een blokbehandeling voor trips uitvoeren in een reeks van twee behandelingen met een minimum spuitinterval van 10 dagen. De blokbehandeling vervolgens afwisselen met een daartoe toegelaten middel met een andere werkwijze en werkzaam op trips.

**BOON MET PEUL (bedekte teelt)**

Een behandeling uitvoeren bij de allereerste vraatsymptomen of bij de aanwezigheid van de eerste insecten.

**BRAAM- en FRAMBOOSACHTIGEN (onbedekte teelt)**

Na vaststelling van de eerste symptomen van een aantasting een behandeling uitvoeren waarbij alle delen van de plant goed geraakt worden, zonodig herhalen. De blokbehandeling voor trips uitvoeren in een reeks van twee behandelingen met een minimum spuitinterval van 10 dagen. De blokbehandeling vervolgens afwisselen met een daartoe toegelaten middel met een andere werkwijze en werkzaam op trips.

**BLOEMKOOL (omvat de verschillende kleurvarianten, inclusief Romanesco), BROCCOLI, SLUITKOOLACHTIGEN (omvat de gewassen spruitkool, spitskool, rode/witte/gele/groene en savooie kool. CHINESE KOOL (omvat ook amsoi, choisum, paksoi, komatsuna, tat soi, mibuna, mizuna en overige oosterse bladkolen), KOOLRAAP, KOOLRABI (onbedekte teelt).**

Traybehandeling uitvoeren kort voordat de planten worden uitgeplant. Het middel toepassen vanaf het 2- tot en met het 4- bladstadium (BBCH 12-14). Uitgangspunt is om de actieve stof in de potgrond van het kluitje te laten dringen. Voor een optimale werking is daartoe het volgende van belang:

- Voer een traybehandeling uit op licht vochtige kluitjes; drogere kluitjes kunnen meer vocht absorberen
- Bevochtig het blad van de plantjes met een kleine hoeveelheid water met een fijne druppel. Dit om de spuitvloeistof gemakkelijker van de plant te laten aflopen naar de potgrond ( $\pm 0.2$  L water/1000 planten).
- TRACER over de planten toepassen in een dusdanige hoeveelheid spuitvloeistof dat het niet uit de tray loopt ( $\pm 4$  L water/1000 planten)
- Na de behandeling de planten bevochtigen met voldoende water zodat de spuitvloeistof die nog op de planten aanwezig is op de potgrond terecht komt ( $\pm 2$  L water/1000 planten)

Een gewasbehandeling in onbedekte teelt van bloemkool en broccoli uitvoeren bij de eerste vraatsymptomen en/of bij aanwezigheid van de eerste rupsen. De behandeling indien nodig herhalen na 10 dagen.

**PREI met uitzondering van preiplantgoed (onbedekte teelt)**

Een gewasbehandeling uitvoeren bij de eerste symptomen en/of bij aanwezigheid van de eerste tripsen. De behandeling indien nodig herhalen na minimaal 10 dagen. Per jaar maximaal 4 bespuitingen met Tracer uitvoeren.

**UIEN, BOSUIEN & SJALOTTEN: Zaaiui, 1e en 2e jaars plantuien, bosui (enkel onbedekte teelt), zilverui, pickler, zaai- en plantsjalotten**

Een gewasbehandeling uitvoeren bij de eerste symptomen en/of bij aanwezigheid van de eerste tripsen. De behandeling indien nodig herhalen na 10 dagen. Per jaar maximaal 4 bespuitingen met Tracer uitvoeren.

**WITLOF (trekteelt)**

TRACER wordt toegepast op de wortelkraag, direct na het opzetten van de witlofwortels. Voor een goed resultaat tegen mineervlieg moet alle vloeistof opgenomen worden door de wortelkraag. Daarom is het van belang dat er een goede bevochtiging van de wortelkraag plaatsvindt zonder dat de vloeistof van de wortels afdruipt. De ideale hoeveelheid water bij de toepassing bedraagt 0,5-1 L water/ m<sup>2</sup>. TRACER wordt binnen de 2 uur volledig opgenomen en zal zich later herverdelen over het groeiende witlof. In het geval van grondwitlof is het daarom belangrijk om enkele uren te wachten na de toepassing, vooraleer de dekgrond aan te brengen.

## EERSTE-HULPMAATREGELEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

### **NA INSLIKKEN:**

De mond spoelen.

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC tel: +31 30 2748888) of een arts raadplegen.

### **NA INADEMING:**

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

Bij onwel voelen het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC tel: +31 30 2748888) of een arts raadplegen.

### **BIJ CONTACT MET DE HUID:**

Verontreinigde kleding uittrekken.

Met veel water wassen.

Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

### **BIJ CONTACT MET DE OGEN:**

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC tel: +31 30 2748888)

## CLASSIFICATIE INFORMATIE

**GEVARENPICTOGRAMMEN :** GHS09

**SIGNAALWOORD :** WAARSCHUWING

**GEVARENAANDUIDINGEN :**

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**VOORZORGSMAATREGELEN :**

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

**AANVULLENDE INFORMATIE :**

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

