

Scelta

Toelatingsnummer: 13440 N W.2

Formulering: Suspensie concentraat

Werkzame stof: cyflumetofen

Gehalte: 20%

Inhoud: 1 l

Voorzorgsmaatregelen:

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Voordat u opnieuw behandelde ruimten/kassen binnengaat, moet u die grondig ventileren tot de spuitvloeistof is opgedroogd.

Aanvullende etiketelementen:

Bevat cyflumetofen; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als mijtenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bloemisterijgewassen m.u.v. roos (bedekte teelt)	mijten ¹	0,1% (100 ml/100 l water)	1,0 L/ha	2 toepassingen per blok, 4 toepassingen per 12 maanden ²	7 dagen binnen een blok
Roos (bedekte teelt)	mijten ¹	0,1% (100 ml/100 l water)	1,5 L/ha	2 toepassingen per blok, 4 toepassingen per 12 maanden ²	7 dagen binnen een blok
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	mijten ¹	0,1% (100 ml/100 l water)	1,0 L/ha	2 toepassingen per blok, 4 toepassingen per 12 maanden ²	7 dagen binnen een blok
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)	mijten ¹	0,1% (100 ml/100 l water)	1,0 L/ha	2 toepassingen per blok, 4 toepassingen per 12 maanden ²	7 dagen binnen een blok

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)	mijten ¹	0,1% (100 ml/100 l water)	1,2 L/ha	2 toepassingen per blok, 4 toepassingen per 12 maanden ²	7 dagen binnen een blok
Vaste plantenteelt	mijten ¹	0,1% (100 ml/100 l water)	1,0 L/ha	2 toepassingen per blok, 4 toepassingen per 12 maanden ²	7 dagen binnen een blok
Houtige beplanting en kruidachtige beplanting	mijten ¹	0,1% (100 ml/100 l water)	1,0 L/ha	2 toepassingen per blok, 4 toepassingen per 12 maanden ²	7 dagen binnen een blok

*Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is bij lagere dosering niet aangetoond.

¹ bonenspintmijt (*Tetranychus urticae*)

² Toepassing heeft een maximum van 2 blokken per 12 maanden. Een blok bestaat uit twee toepassingen met een interval van 7 dagen. Tussen de 2 blokken dienen tenminste twee toepassingen te worden uitgevoerd met middelen uit een andere chemische groep.

Het gebruik in de teelt van bedekte veredeling en zaadteelt en de onbedekte veredeling en bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestersgewassen, voedergewassen, witlof, cichorei, boekweit, hop, meekrap en olifantsgras is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bedekte veredeling en zaadteelt	mijten ¹	0.1% (100 ml/100 l water)	1,5 L/ha	2 toepassingen per blok, 4 toepassingen per 12 maanden ²	7 dagen binnen een blok
Onbedekte teelt van veredeling en bloemenzaadteelt,	mijten ¹	0.1% (100 ml/100 l)	1,0 L/ha	2 toepassingen per blok, 4 toepassingen per	7 dagen binnen een blok

Toepassingsgebied	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* (middel) per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestersgewassen, voedergewassen, witlof, cichorei, boekweit, hop, meekrap en olifantsgras.		water)		12 maanden ²	

*Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

¹ bonenspintmijt (*Tetranychus urticae*)

² Toepassing heeft een maximum van 2 blokken per 12 maanden. Een blok bestaat uit twee toepassingen met een interval van 7 dagen. Tussen de 2 blokken dienen tenminste twee toepassingen te worden uitgevoerd met middelen uit een andere chemische groep.

Toepassingsvoorwaarden

Dit middel mag in boomkwekerijgewassen alleen worden toegepast indien er geen andere vegetatie dan het geteelde gewas aanwezig is.

Dit middel mag in de onbedekte teelt uitsluitend door middel van een neerwaartse bespuiting toegepast worden in gewassen van maximaal 50 cm hoog.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof cyflumetofen. Cyflumetofen behoort tot de Beta-ketonitrile derivatieven De Frac code is 25. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Aanbevelingen

Scelta is een mijtenbestrijdingsmiddel voor gebruik in kassen en volle grond. Toepassen met voldoende water om optimale bevochtiging te bereiken van zowel de boven- als de onderkant van de bladeren.

Het verdient aanbeveling door middel van een proefbespuiting vast te stellen of de te behandelen gewasvariëteiten het middel goed verdragen.

Goed schudden voor gebruik.

Vorstvrij, koel en droog bewaren.