



# Sportak EW

Toelatingsnummer 11567 N W.1

**Productgroep:** fungicide

**Formulering:** emulsie, olie in water

**Werkzame stof:** 450 g/l prochloraz



**WAARSCHUWING**

## Gevarenaanduidingen:

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

## Voorzorgsmaatregelen:

P280 Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

## Aanvullende etiketelementen:

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

## Eerstehulpmaatregelen

**Algemeen advies:** Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts. Verontreinigde kleding verwijderen.

**Na inademen:** Rust, frisse lucht.

**Na huidcontact:** Met water en zeep grondig wassen.

**Na contact met de ogen:** Minstens 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen.

**Na inslikken:** Mond spoelen en daarna rijkelijk water drinken.

**Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:**

Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies).

---

## WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel:

- a. in de teelt van wintertarwe, zomertarwe, wintergerst en zomergerst;
- b. ten behoeve van de teelt van bloembol- en bolbloemgewassen.

### Veiligheidstermijn

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan **6 weken** voor **wintertarwe, zomertarwe, wintergerst en zomergerst**.

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandelde bollen en/of knollen.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

## GEBRUIKSAANWIJZING

**Wintertarwe en zomertarwe**, ter bestrijding van bladvlekkenziekte (*Mycosphaerella graminicola*) en kafjesbruin (*Leptosphaeria nodorum*).  
Een éénmalige behandeling uitvoeren in de periode vanaf het verschijnen van het vlagblad tot begin bloei.

**Dosering:** 1 liter per ha in combinatie met een daartoe geëigend middel ter bestrijding van andere blad- en aarziekten.

**Wintertarwe en zomertarwe**, ter bestrijding van meeldauw (*Erysiphe graminis f. sp. tritici*).

Een bespuiting uitvoeren zodra tijdens het schieten van het gewas op het derde blad van boven meeldauw wordt waargenomen.

**Dosering:** 1 liter per ha.

**Wintergerst en zomergerst**, ter bestrijding van meeldauw (*Erysiphe graminis f. sp. hordei*).

Een bespuiting uitvoeren zodra tijdens het schieten van het gewas op het derde blad van boven meeldauw wordt waargenomen.

**Dosering:** 1 liter per ha.

**Wintergerst**, ter bestrijding van bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*) en netvlekkenziekte (*Pyrenophora teres*).

Een behandeling uitvoeren zodra in het voorjaar aantasting wordt waargenomen.

De behandeling zonodig herhalen.

**Dosering:** 1 liter per ha.

### **Dompelbehandeling van bloembollen en bolbloemen**

In deze gebruiksaanwijzing is voor de toepassingen voor bloembollenplantgoed steeds uitgegaan van een standaardontsmettingswijze waarbij gestreefd dient te worden naar minimale restanten door opgebruik. Voor de toegestane wijze van verwerken van restanten ontsmettingsvloeistof wordt verwezen naar de "Beschikking verwijdering dompelvloeistof bloembollen en -knollen".

Voor andere toepassingstechnieken (kort dompelen, schuimen e.d.) zullen afgeleide doseringen nodig zijn. Raadpleeg hiervoor de betreffende voorlichtingspublicaties waarin tevens is aangegeven hoe, overeenkomstig voornoemde Beschikking, de restanten kunnen worden verwerkt.

**Hippeastrum**, ter bestrijding van *Stagonospora* en wortelrot (*Fusarium*-soort).

Bij voorkeur vlak voor het planten de bollen gedurende 15 minuten dompelen in een oplossing van 0,2-0,4% (200-400 ml per 100 liter water). De hoogste dosering gebruiken voor de kleinere maten plantgoed.

Enige groeivertraging is niet uitgesloten; bij bloeibare bollen moet de dosering niet hoger zijn dan 0,2% terwijl op het moment van behandeling uiterlijk nog geen blad en/of knop zichtbaar mag zijn i.v.m. risico's van bloemsteelverruwing.

**Gladiolen**, ter bestrijding van knolrot (*Fusarium oxysporum f.sp. gladioli*).

Het plantgoed gedurende 15 minuten dompelen in een oplossing van 0,4% (400 ml per 100 liter water).

**Nerines**, ter bestrijding van bolrot (*Fusarium sacchari var. elongatum*).

De bollen vlak voor het planten gedurende 15 minuten dompelen in een oplossing van 0,4% middel (400 ml per 100 liter water).

**Hyacinten**, ter bestrijding van huidziekte (*Fusarium oxysporum f.sp. hyacinthi* en *Embellisia hyacinthi*).

Het plantgoed vlak voor het planten gedurende 15 minuten dompelen in een oplossing van 0,2-0,4% (200-400 ml per 100 liter water) waaraan 1% formaline 40% (1 liter per 100 liter water) wordt toegevoegd.

De hoogste concentratie middel gebruiken naarmate het *Fusarium*-probleem in sterkere mate voorkomt.

De wortelkranen moeten ten tijde van de behandeling nog in rust zijn en het verdient aanbeveling de bollen direct na de behandeling te planten.

**Tulpenplantgoed**, ter bestrijding van huidziek (*Septocylindrium*-soort) en zuur (*Fusarium oxysporum f.sp. tulipae*).

Het plantgoed kort voor het planten gedurende 15 minuten dompelen in een oplossing van 0,2-0,4% (200-400 ml per 100 liter water), afhankelijk van de mate waarin het optreden van de ziekte wordt verwacht.

Daar in combinatie met zineb/maneb bevattende producten uitvlokingsproblemen ontstaan, het middel uitsluitend ten behoeve van de basisontsmetting in combinatie met een daartoe geëigend middel gebruiken.

**Narcis**, ter voorkoming van de verspreiding van bolrot (*Fusarium oxysporum f.sp. narcissi*), koprot (*Botryotinia narcissicola* en/of *Stagonospora*-soort) en huidziek bij het dompelen van plantgoed.

Wanneer plantgoed wordt gedompeld, hetzij in een 2-uurs-warmwaterbad of in een koudwaterbad (15 minuten), kan het middel aan het dompelbad worden toegevoegd in een concentratie van 0,1% (100 ml per 100 liter dompelvloeistof) in combinatie met andere voor dit doel toegelaten middelen.

Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij laat ontsmetten en vooral wanneer er al een sterke spruitontwikkeling is, is er kans op schade.

**Lelieplantgoed**, ter bestrijding van bewaarrot (*Penicillium*-soort), bolrot (*Fusarium oxysporum*) en schubrot (*Nectria radicola*).

Het plantgoed bij voorkeur kort na de oogst en voor het in bewaring brengen gedurende 5 tot 15 minuten dompelen in een oplossing van 0,2 tot 0,3% Sportak EW (200-300 ml per 100 liter water). Concentratie en duur van de dompeling zijn afhankelijk van aard en ernst van het ziekteprobleem.

Onder bepaalde omstandigheden, vooral wanneer nieuwe spruitontwikkeling op gang is gekomen, is er kans op schade.

**Leverbare lilies**, ter bestrijding van bewaarrot (*Penicillium*-soorten) en bolrot (*Fusarium oxysporum*).

De bollen vlak voor het inpakken gedurende 1-15 minuten dompelen in een concentratie van 0,2% (200 ml per 100 liter water).

#### **Re-entry**

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

#### **Product stewardship**

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op [www.toolboxwater.nl](http://www.toolboxwater.nl). Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor elke schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.

**BASF Nederland B.V.**  
**Divisie Agro**  
**Postbus 1019**  
**6801 MC Arnhem**  
**Tel. 026-3717171**