




Rodilon[®] BLOCKS

RODENTICIDE

- ✓ Zwarte ratten, bruine ratten en huismuizen in gebouwen
- ✓ Zwarte ratten en bruine ratten om gebouwen en voedselopslagplaatsen
- ✓ Bestand tegen vocht en schimmels

Toelatingsnummer: 13515 N
Werkzame stof: Difethialon
Gehalte: 0,0025%
Aard van het preparaat:
RB (Lokmiddel klaar voor gebruik)
CAS nr: 104653-34-1



BLOCKS

Inhoud :
4 kg e

H373: Kan schade aan bloed veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P260: Stof niet inademen.
P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P273: Voorkomtoezing in het milieu.
P280: Beschermende handschoenen dragen.
P314: Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P501: Gooi de inhoud en de verpakking verwerken volgens de lokale / nationale regelgeving.



WAARSCHUWING



Huismuizen, zwarte en bruine ratten





Rodilon[®] BLOCKS

GEbruiksaanwijzing

Rodilon Blocks is een kant-en-klaar lokaas in blok formulering dat uitsluitend binnenshuis mag worden toegepast. Het lokaas uitzetten op plaatsen waar de ratten en muizen geregeld komen: in de nabijheid van hol ingangen, op looppaden (sporen!) en op plaatsen waar de dieren voedsel halen of knagen. Het middel dient gedurende een aantal dagen in voldoende mate te worden gegeten door ratten en huismuizen.

Controleer de eerste opname na 3 dagen en vervolgens regelmatig op basis van opname (wekelijks of elke 14 dagen). Ververs of vul het lokaas daar waar nodig is aan tot er in het geheel geen opname meer plaatsvindt. Middel dat beschimmeld of verontreinigd is totaal vervangen. Indien het lokaas geheel opgegeten is, met een dubbele hoeveelheid lokaas hervullen.

Verder de nodige maatregelen (laten) treffen in het belang van muus- en ratwering (ingangen afichten, mogelijk voer verwijderen, etc.). Indien in aangebouwde ruimten ook ratten of muizen aanwezig zijn, zullen de resultaten slechts blijvend zijn, wanneer ook daar een bestrijdingsactie wordt uitgevoerd.

Resistentie management:

Voor de werkzame stof aanwezig in het middel, difethialon, is er een risico dat muizen of ratten resistentie ontwikkelen. Gebruik dit middel daarom niet in gevallen dat resistentie waarschijnlijk is, bijvoorbeeld in gevallen dat vorige bestrijdingsacties met difethialon bevattende middelen niet hebben geresulteerd in een duidelijke vermindering van de populatie. Het middel mag niet permanent gebruikt worden.

Bestrijding van ratten om gebouwen en voedselopslagplaatsen:

- Bij gebruik ter bestrijding van ratten om gebouwen of voedselopslagplaatsen mag het middel alleen gebruikt worden als laatste schakel in een bestrijdingsprogramma dat geheel gebaseerd is op de principes van IPM, en wel:
- tot 1-1-2017 uitsluitend door bedrijven die zich hebben aangemeld bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.
- vanaf 1-1-2017 uitsluitend door bedrijven die zijn gecertificeerd voor IPM-buitengebruik op basis van een protocol dat voldoet aan de eisen zoals die zijn vastgesteld en gepubliceerd door het Ctgb.

Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, eerste hulp instructies en maatregelen om mens, dier en milieu te beschermen.

Dit product bevat anticoagulantia die een groot risico vormen voor doorvergiftiging van (roof)vogels en zoogdieren. buitengebruik is daarom alleen en bij uitzondering toegestaan voor de bestrijding van de ratten indien alle andere maatregelen in kader van het bestrijdingsprogramma, gebaseerd op de principes van IPM, onvoldoende resultaat hebben opgeleverd.

Zet het lokaas veilig in lokkoofs of veilig afgedekt op hiervoor geschikte trays, zodat het risico van consumptie door andere dieren (huis- of landbouwdieren, vogels) en kinderen wordt geminimaliseerd. Indien mogelijk het lokaas zo vastmaken dat het niet weggesleept kan worden. De lokaasdoosjes of veilig afgedekte trays markeren zodat duidelijk is dat rodenticiden bevatten. Na gebruik handen wassen. Katten tijdens een bestrijdingsactie extra goed voeren. Na gebruik handen wassen.

Houdt dit etiket beschikbaar wanneer medisch advies wordt ingewonnen. In geval van nood contact opnemen met een dokter. Tegengif Vitamine K1 (onder medische begeleiding).

Instructies voor de veilige afvoer van het product en zijn verpakking

Wanneer de opname van lokaas is gestopt, de resten van het lokaas verzamelen en in plastic verpakt aanbieden bij het Klein Chemisch Afval (KCA) depot.

Dode dieren (de eerste worden na ca. 3 dagen gevonden) eveneens verzamelen en in plastic verpakt in het vuilnisvat deponeren, opdat huismuizen en andere dieren niet door het opeten van de kadavers worden vergiftigd.

Opslagcondities en houdbaarheid van het product

Houdbaarheid: 3 jaar.

- H373:** Kan schade aan bloed veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P260: Stof niet inademen.
P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P273: Voorkomtoezing in het milieu.
P280: Beschermde handschoenen dragen.
P314: Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P501: Gooi de inhoud en de verpakking verwerken volgens de lokale / nationale regelgeving.



WAARSCHUWING

WETTELIJK GEBRUIKSVoORSCHRIFT

Middel ter bestrijding van huismuizen in gebouwen en middel ter bestrijding van ratten in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen als laatste schakel in een bestrijding die geheel gebaseerd is op de principes van IPM.

Doelorganismen (inclusief ontwikkelingsstadia)

Bruine ratten, Zwarte ratten, Huismuizen.

Toepassing

Huismuizen: in afgesloten ruimten.

Bruine en zwarte ratten: in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen.

Toepassingsmethode

Rodilon Blocks is een kant-en-klaar lokaas dat, moet worden uitgelegd in speciaal hiervoor bestemde lokaasdoosjes of veilig afgedekt op hiervoor geschikte trays.

Dosering en frequentie van toepassing

Bestrijding van muizen:

Plaats het lokaas op een afstand van 1 tot 3 meter van elkaar afhankelijk van de grootte van de muizenplaag. Gebruik 40 gram lokaas per plek.

Bestrijding van ratten in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen:

Plaats het lokaas op een afstand van 4 tot 10 meter van elkaar afhankelijk van de grootte van de rattenplaag. Gebruik 120 gram lokaas per plek. (NB: ingeval van zwarte ratten vooral hooggelegen voerplaatsen inrichten).

Gebruikers

Professioneel gebruik

Gebruik om gebouwen en voedselopslagplaatsen:

- tot 1-1-2017 uitsluitend door bedrijven die zich hebben aangemeld bij de Inspectie Leefomgeving en Transport
- vanaf 1-1-2017 uitsluitend door bedrijven die zijn gecertificeerd voor IPM-buitengebruik op basis van een protocol dat voldoet aan de eisen zoals die zijn vastgesteld en gepubliceerd door het Ctgb.

Chargenummer: zie verpakking
 Productie datum: zie verpakking
 Houdbaarheid: tot 3 jaar na productie

© Geregistreerd handelsmerk
 Bitrex® is een geregistreerd handelsmerk van Macfarlan Smith

TOELATINGSHOUDER:
 LiphaTech S.A.S.
 Bonnel CS 10005
 47480 POINT DU CASSE
 FRANKRIJK

DISTRIBUTEUR:
 Bayer Cropscience SA-NV
 Postbus 231
 3640 AE MIDRECHT (NL)
 tel. 0297-280413

Bayer

NL80549334G - ARTICLE 80543948



8 712171 017115