



Corum

Toelatingsnummer 14591 N

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Productgroep: | herbicide |
| Formulering: | met water mengbaar concentraat |
| Werkzame stof: | bentazon 480 g/l imazamox 22,4 g/l |

| | |
|---|----------|
| De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: | Bentazon |
|---|----------|

**WAARSCHUWING****Gevarenaanduidingen:**

| | |
|------|--|
| H302 | Schadelijk bij inslikken. |
| H410 | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

Voorzorgsmaatregelen:

| | |
|-------------|--|
| P264 | Na het werken met dit product handen grondig wassen. |
| P270 | Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. |
| P273 | Voorkom lozing in het milieu. |
| P301 + P312 | NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. |
| P330 | De mond spoelen. |
| P391 | Gelekte/gemorste stof opruimen. |
| SP 1 | Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. |

Aanvullende etiketelementen:

| | |
|--------|--|
| EUH208 | Bevat bentazon. Kan een allergische reactie veroorzaken. |
| EUH401 | Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. |

Eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies: Hou het etiket van dit product bij de hand indien contact opgenomen wordt met het BASF-telefoonnummer of arts. Verontreinigde kleding verwijderen.

Na inademen: Rust, frisse lucht, doktershulp.

Na huidcontact: Met veel water en zeep grondig wassen.

Na contact met de ogen: Minstens 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen.

Na inslikken: Onmiddellijk mond spoelen en vervolgens 200-300 ml water drinken, medische hulp.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:

Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies), geen specifiek tegengif bekend.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van na opkomst toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

| Toepassingsgebied | Te bestrijden organisme | Dosering (middel) per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus | Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus | Minimum interval tussen toepassingen in dagen |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| Peulvruchten | Breedbladige onkruiden | 1,25 l/ha | 1 | 1,25 l/ha | - |
| | | 0,625 l/ha | 2 | | 7 |
| Veldboon (voor ensilage) | Breedbladige onkruiden | 1,25 l/ha | 1 | 1,25 l/ha | - |
| | | 0,625 l/ha | 2 | | 7 |
| Boon met peul (onbedekte teelt) | Breedbladige onkruiden | 1,25 l/ha | 1 | 1,25 l/ha | - |
| | | 0,625 l/ha | 2 | | 7 |
| Boon zonder peul | Breedbladige onkruiden | 1,25 l/ha | 1 | 1,25 l/ha | - |
| | | 0,625 l/ha | 2 | | 7 |
| Erwt met peul (onbedekte teelt) | Breedbladige onkruiden | 1,25 l/ha | 1 | 1,25 l/ha | - |
| | | 0,625 l/ha | 2 | | 7 |
| Erwt zonder peul | Breedbladige onkruiden | 1,25 l/ha | 1 | 1,25 l/ha | - |
| | | 0,625 l/ha | 2 | | 7 |

Toepassingsvoorwaarden

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 50% drift reducerende spuitdoppen.

AANBEVELINGEN

Product stewardship

Raadpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

Algemeen

Spuit op een droog gewas. Temperaturen boven de 12 °C alsmede zonlicht bevorderen de werking. Ook het gebruik van een uitvloeier bevordert de werking.

Re-entry

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

Gewassen

Peulvruchten,

Pas Corum toe in het 2^e-3^e samengestelde bladstadium van het gewas.

Veldboon (voor ensilage),

Pas Corum toe in het 1^e drietalligbladstadium van het gewas.

Boon met peul

Pas Corum toe in het 1^e drietalligbladstadium van het gewas.

Erwt met peul

Pas Corum toe in het 2^e-3^e samengestelde bladstadium van het gewas.

Erwt zonder peul

Pas Corum toe in het 2^e-3^e samengestelde bladstadium van het gewas.

Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het product, als het volgens onze gebruiksaanwijzing wordt toegepast, geschikt is voor de aangegeven gebruiksdoeleinden. Daar echter de bewaring, het transport en het gebruik ervan aan onze controle ontsnappen, en gezien wij evenmin alle omstandigheden ervan kunnen voorzien, wijzen wij elke verantwoordelijkheid voor de bereikte resultaten en/of voor de schade die zou voortvloeien uit de bewaring, het transport of de toepassing ervan, van de hand. Wij waarborgen enkel de constante kwaliteit van het geleverde product.

BASF Nederland B.V.

Divisie Agro

Postbus 1019

6801 MC Arnhem

Tel. 026-3717171