

Crown MH

Toelatingsnummer: 15038 N

Aard van het preparaat: Met water mengbaar concentraat

Werkzame stof: maleine hydrazide

Gehalte: 270 G/L

Inhoud: 15 l, 200, 600 l

Voorzorgsmaatregelen:

Voorkom lozing in het milieu.

Gelekte/gemorste stof opruimen.

Zorg er voor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen:

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als groeiregulator door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassings-Gebied	Doel groeiregulatie	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Consumptieaardappel	Tegengaan van kieming van de knollen tijdens de bewaring en tegengaan van aardappelopslag in het volggewas	11 L/ha	1	21 dagen
Zetmeelaardappel	Tegengaan van kieming van de knollen tijdens de bewaring en tegengaan van aardappelopslag in het volggewas	11 L/ha	1	21 dagen
Uien (m.u.v eerstejaars plantui)	Tegengaan van spruitvorming tijdens de bewaring	8,9 L/ha	1	4 dagen

Het gebruik in de teelt van sjalotten en knoflook is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied(en), komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Doel groeiregulatie	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per bewaarcyclus	Veiligheidsstermijn in dagen
Sjalotten Knoflook	Tegengaan van spruitvorming tijdens de bewaring	8,9 l/ha	1	4 dagen

Toepassingsvoorwaarden

In de teelt van consumptieaardappel en zetmeelaardappel 300 tot 600 liter water per hectare toepassen. In de teelt van zaaiuien, zilveruien, picklers, 2^o jaars plantuien, sjalotten en knoflook 500 tot 600 liter water per hectare toepassen.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan wanneer gebruik wordt gemaakt van minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een kantdop.

Aanbevelingen

Algemeen

Crown MH is een systemisch middel. Door een gewasbehandeling wordt spruitvorming of kieming tijdens de bewaring geremd.

- Uitsluitend toepassen op een gezond gewas.
- Niet toepassen bij temperaturen hoger dan 25 °C.
- Na toepassing moet het minimaal 10 uur droog blijven om het middel voldoende te laten opnemen.
- Na de bespuiting de spuit tank en spuitmateriaal grondig schoonmaken.

Mengingen

Niet mengen met andere gewasbeschermingsmiddelen.

Bewaren

Product bewaren boven 4 °C; wordt het product blootgesteld aan lagere temperaturen, dan kan enige kristallisatie optreden. De kristallisatie is eenvoudig in oplossing te krijgen door schudden of roeren voor gebruik.

Uien (m.u.v. eerstejaars plantui)

- Toepassen bij de eerste verschijnselen van strijken.
- Bij toepassing in dit gewas een uitvloeier toevoegen.
- Voor een goede opname moet het gewas na toepassing minimaal 14 dagen vitaal blijven.

Consumptie- en zetmeelaardappelen

- Bij toepassing in deze gewassen geen uitvloeier toevoegen.
- Toepassen 3 - 5 weken voor het geschatte loofdoodmoment.
- Voor een goede opname moet het gewas na toepassing minimaal 21 dagen vitaal blijven.
- Tijdens de bewaring kan een aanvullende behandeling met een ander toegelaten kiemremmingsmiddel noodzakelijk zijn; controleer daarom regelmatig de aardappelen op kieming.
- Toepassing van Crown MH leidt ook tot vermindering van het aantal opslagplanten in het volggewas. Echter om voldoende opslagbestrijding te krijgen kan het noodzakelijk zijn aanvullende maatregelen te nemen.