



# Contans<sup>®</sup> WG

12 kg

Toelatingsnr. 12423 N

Fungicide



ARTIKELNR.: 60469529

**Productnaam:** Contans  
**Toelatingsnummer:** 12423 N W1  
**Aard van het preparaat:** Water dispergeerbaar granulaat

**Werkzame stof:**  
Coniothyrium minitans

**Gehalte:** 5%

**Voorzorgsmaatregelen**

P261 Inademing van stof vermijden.  
P280 Beschermende handschoenen dragen.

P284 Adembescherming dragen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.


**Aanvullende etiketelementen**

EUH208 Bevat Coniothyrium minitans. Kan een allergische reactie veroorzaken.

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Micro-organismen kunnen eventueel sensibiliserende reacties provoceren.

**Voor persoonlijk beschermingsadvies op maat ga naar [www.dresscode.bayer.nl](http://www.dresscode.bayer.nl)**



**STORL VERPAKKING**

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.

Onderstaande QR-code verwijst naar de laatste productinformatie



**IN GEVAL VAN NOOD:**  
**Bij vergiftiging uitsluitend bestemd voor professionele hulpverleners:**  
**Nationaal Vergiftigingsinformatie Centrum (NVIC) +31 (0)30-274 8888**  
**In overige gevallen Bayer CropScience +31 (0)6-553 724 90**

NL60504510E



**Beschrijving van de eerste gebruiksaanwijzing:** Algemeen advies: Buiten de gewasrijke zone brengen. Ligging en verwoer van het slachtoffer in stabiele zijdelingse, Verontreinigde Kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen.  
**Inademing:** In de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm en rustig houden. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.  
**Anraking met de huid:** Met zeep en water wassen.  
**Anraking met de ogen:** Bij aanhoudende oogirritatie of roodheid een oogarts opzoeken. Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten verwijderen. Daarna de oogspoeling weer voortzetten.  
**Inhalatie:** Mond spoelen en vervolgens water met kleine slokken laten drinken. GEEN braken opwekken tenzij op aanwijzing van arts of Nederlands Vergiftigingsinformatie Centrum (NVIC).  
**Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**  
**Verschijnselen:** Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.  
**Vermelding van de vereriste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**  
**Behandeling:** Symptomatisch behandelen. Een specifiek tegengif is niet bekend.

### WETTELIJK GEBRUIKSVORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitieflijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctbj juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

**Toepassingsvoorwaarden:**

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden
Akkerbouwgewassen (onbedekte teelt)	Grondbehandeling, voor of tijdens zaaien	Sclerotienrot <sup>1,2</sup>	2 kg/ha	1
Aardappelen	Na de oogst behandeling, voor de koude bewaring	Sclerotienrot <sup>1,2</sup>	50 g per 1000 kg aardappelen	1
Witlof (oemeteelt)	Na de oogst behandeling, voor de koude bewaring	Sclerotienrot <sup>1,2</sup>	50 g per 1000 kg penen	1
Groenteteelt	Grondbehandeling, voor of tijdens zaaien of planten	Sclerotienrot <sup>1,2</sup>	4 kg/ha	1
Wortelen	Na de oogst behandeling, voor de koude bewaring	Sclerotienrot <sup>1,2</sup>	50 g per 1000 kg wortelen	1
Siersteltgewassen	Grondbehandeling, voor of tijdens zaaien of planten	Sclerotienrot <sup>1,2</sup>	4 kg/ha	1

\* Afhankelijk van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgezien. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

<sup>1</sup> Sclerotienrot (*Sclerotinia minor*)

<sup>2</sup> Sclerotienrot (*Sclerotinia sclerotiorum*)

**Overige toepassingsvoorwaarden**

Voor de na-oogst behandeling dient 10-20 liter spuitvoelstof te worden gebruikt per 1000 kg aardappelen, witlofpenen of wortelen.

Inwerken in de grond voor landbouwgewassen tot 5 cm, voor groenteteelt en siersteltgewassen tot 5 cm.

In de teelt van akkerbouwgewassen het middel toepassen in 150-400 L water /ha.

In de onbedekte groenteteelt en de teelt van siersteltgewassen het middel toepassen in 200-1200 L water /ha.

In de teelt van siersteltgewassen het middel toepassen in 200-1200 L water /ha.

Bevat *coniothyrium minitans* CON/M/91-8. Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.

### AANBEVELINGEN

**Algemeen**

Contans WG bevat sporen van *Coniothyrium minitans* - een schimmel die de sclerotien van bepaalde Sclerotinia-soorten zoals *Sclerotinia sclerotiorum* en *Sclerotinia minor* parasiteert. Het parasiteren van de sclerotien gebeurt na contact met de sporen van *Coniothyrium minitans*. Door het parasiteren van de sclerotien wordt de infectiebron van *Sclerotinia sclerotiorum* en *S. minor* verminderd zodat de infectiedruk verlaagd wordt met een verminderde aantasting tot gevolg. Daarnaast heeft Contans WG ook een directe werking op de myceliumontwikkeling van *Sclerotinia minor*.

Op zwaar besmette percelen is het effect van een eenmalige behandeling veelal niet toereikend. In dergelijke situaties zullen opeenvolgende behandelingen noodzakelijk zijn om uiteindelijk te komen tot verlaging van de infectiedruk vanuit de grond.

**TOEGELATEN IN**

**Definitieflijst toepassingsgebieden (DTG).** De toepassingsgebieden op het etiket volgen de indeling van DTG lijst 2.1 (Ctbj, juni 2015).

Wilt u weten onder welke sub- en toedingsgroep een gewas valt en of een middel dus een toelating heeft in het betreffende gewas kunt u dit vinden via onze website (<http://agro.bayer.nl/Producten/DTG>)

**Toepassing**

Contans WG kan worden toegepast met de gebruikelijke spuitapparatuur gevolgd door het inwerken in de bodem. Pas Contans WG toe met gereinigde spuitapparatuur zonder resten van voorafgaande behandelingen. Om aanstasting door Sclerotinia via ascosporen te vermijden, wordt aanbevolen om Contans WG goed te mengen door de volledige - door Sclerotinia aangestane - zone.

**Veiligheidsaanbevelingen bij het beredering**

Geen.

**Opslag en verwijdering**

Verkoop alleen toegestaan in opengepoede originele verpakking. Droog en achter slot bewaren. Verpakking kol bewaren bij maximum 4°C. Bij kamertemperatuur (20°C) het product binnen 14 dagen verwerken.

**Verbod gebruik verpakking**

Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.

**Voorkomen emissie**

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert Bayer Crop Science om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast overdekt te stallen en te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangomgheikhed voor verontreinigde vloeistoffen.

Verwerk was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatste bespoten perceel kunnen worden uitgereden in een Phytobac<sup>®</sup> (of gelijkwaardige methode) om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Readpleeg de "Toolbox Emissiebeperking" op [www.tooboxwater.nl](http://www.tooboxwater.nl) voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afsleping en hoe deze te beperken.

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de - na zorgvuldig onderzoek - opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Bayer CropScience zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. Kunnen van werking van het product beïnvloeden, zodat Bayer CropScience in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren. Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.

Chargennummer: zie elders op de verpakking

© is een geregistreerd handelsmerk

van de Bayer Groep

Bayer CropScience SA-NV

Postbus 231

3640 AE Mijdrecht

Tel. 0297-280358

Bayer